

N° agrément PA00029

POMMIERS

Pour le moment, aucune intervention n'est à envisager.

POIRIERS

Le PSYLLE

Il est déterminant d'effectuer des interventions précoces pour éviter les dépôts d'œufs d'hiver (une femelle pond environ 500 œufs sous les écorces et à la base des bourgeons).

La lutte :

La maturité des femelles est atteinte (30 à 50% selon les secteurs) nous vous conseillons d'appliquer :

SURROUND WP à 30 Kg/ha
Mouillage 1000 L/ha

C'est l'argile du marché qui a la meilleure micronisation et le meilleur pouvoir couvrant (effet blanc sur les arbres).

Renouveler le traitement si pluie lessivante, effectuer 2 à 3 passages.

Au débourrement (début mars) appliqué le mélange

EUPHYTANE GOLD/ OVISPRAY à 2 L/hl
+ KLARTAN à 0.060 L/hl

Ce mélange est efficace contre le puceron mauve du poirier et l'ensemble des tordeuses.

Pour ceux qui ne peuvent pas appliquer d'argile, appliquez après deux jours de beau temps et température supérieur à 10°C: **Euphytane 2L/ hl + Pearl Protech 0.083L/Hl**



Bactérioses / Tavelure

Au Stade B/C

Utiliser

PASTA CAFFARO /YUCCA à 0.7L/hl
ou **KOCIDE 2000 à 0.35 Kg/hl**, contre la tavelure et les bactérioses.

PECHER



Cloque

Intervenir de manière préventive en janvier avec

PASTA CAFARRO/YUCCA à 0.7 L/hl
ou B BORDELAISE à 1.50 kg/hl

Si les conditions sont favorables à la cloque, 10 jours après utiliser SYLLIT à 0.225 L/ hl.

Le SYLLIT est non lessivable

Xantomonas

Dans les vergers ayant eu du Xantomonas en 2013, dès le stade B effectuer un second traitement avec PASTA CAFFARO à 0.35 L/hl.

Fusicocum/ Cytospora

C'est essentiellement un parasite de blessures, quelques variétés sont sensibles.

Traiter avec

TOPSIN WG à 0.170 Kg/hl
ou DELAN à 0.070 kg/hl.

Stade B

Dès le stade B employer :

EUPHYTANE GOLD/ OVISPRAY
à 1.500 L/hl
+ EXAQ 2M à 0.220L/hl



Cette stratégie de lutte est orientée contre les cochenilles.

Produit contre la cloque :
RHODIASAN à 0.250 Kg/hl

Stade C

Pour lutter contre le Puceron vert :
EUPHYTANE GOLD/ OVISPRAY
à 1.000 L/hl
+ SUPREME SG à 0.025 Kg/hl
Non dangereux pour les abeilles.




Produit contre la cloque :
RHODIASAN à 0.250 Kg/hl

Stade D/E

Contre la cloque :
RHODIASAN à 0.250 Kg/hl

Contre les monilioses :
TOPSIN WG à 0.100 Kg/hl
ou SWITCH à 0.020 Kg/hl

Physio activateur de la nouaison :
GOEMAR BM start à 0.200 L/hl
Ou TRAINER à 0.5 L/hl





CERISIER



Février

Contre les bactérioses et chancre :
PASTA CAFFARO/YUCCA à 0.350 L/hl
ou KOCIDE à 0.350 Kg/hl.

Au gonflement des bourgeons :
EUPHYTANE GOLD à 2.000 L/hl
+ SUPREME SG à 0.025 Kg/hl contre
le puceron noir.

ABRICOTIER

Début Février

Contre les bactérioses et chancre :
PASTA CAFFARO/YUCCA à 0.350 L/hl
ou KOCIDE à 0.350 Kg/hl

Stade C/D

Contre les Monilioses :
SWITCH à 0.020 Kg/hl
Contre les pucerons :
SUPREME SG à 0.025 Kg/hl.

PRUNIER

Début février

Contre les bactérioses et chancre :
PASTA CAFFARO/YUCCA à 0.350 L/hl
ou KOCIDE 2000 à 0.350 Kg/hl

Au gonflement des bourgeons :
EUPHYTANE GOLD/ OVISPRAY à
2.000 L/hl
+ KARATE K à 0.100 L/hl

Stade C/D

Contre les Monilioses :
TOPSIN WG à 0.100 Kg/hl
ou SWITCH à 0.020 Kg/hl
Physio activateur de la nouaison
GOEMAR BM START à 0.20L/hl.



LUTTE CONTRE LES RATS

Surveiller les tumulus et intervenir manuellement si nécessaire.



DESHERBAGE

Important : Les doses sont données pour un désherbage en plein.

Il est indispensable pour réussir le désherbage de position de traiter sur sol humide.

Jeunes vergers & Noyaux

Nous conseillons fin janvier :

SURFLAN 7 L/ha

+ CENT 7 8 L/ha

* A employer jusqu'au stade B maximum

Utiliser BASTA à 5 l/ha s'il y a présence d'herbes (Sauf sur les vergers de l'année).

A utiliser seul (classe T).

Arbres à pépins & Noyaux de + de 3 ans

SHEIK* 3,5 L/ha

* A employer jusqu'au stade B maximum.

Si présence d'herbes utiliser

CAYENNE 4.5L/ha.

ou BUGGY S 7L/ Ha

+ STIMUL 3.5 L/Ha

Les produits phytopharmaceutiques et votre santé :

Procurez-vous la Fiche de Données de Sécurité des produits (FDS)

Téléchargez-la sur internet à l'adresse suivante :

<http://www.quickfds.fr>

et retrouver ce lien sur notre site dans infos techniques Réglementaire

www.omag.fr

BASTA F1	AV N° 9000471	Teneur : Glufonisate Ammonium 150 g/L	classé T	R60 R41 R21/22 R63 R48/22
BOUILLIE BORDELAISE	AV N° 6200075	Teneur : Cuivre du sulfate 20 %	Non classé	
BUGGY S	AV N° 9100479	Teneur : Glyphosate 240 g/l	classé Xi N	R41R51/53
CENT 7	AV N° 8400528	Teneur : Isoxaben 125. G/L	classé N	
EUPHYTANE GOLD	AV N° 9300504	Teneur : Huile de vaseline 817 g/l	Non classé	
EXAQ	AV N° 2040315	Teneur : Chlorpyrifos-éthyl 228 g/L	classé Xn N	R22 R36/38 R50/53
KARATE K	AV N° 8800395	Teneur: Pyrimicarbe 100. G/L, Lambda cyhalothrine 5. G/L	classé Xn N	R38 R20/22 R50 R53
KOCIDE 2000	AV N° 9700401	Teneur : Hydroxyde de cuivre 35 %	classé Xn	R22/ R41 R50/53
OVISPRAY	AV N° 9400496	Teneur: Huile minerale paraffinique 800. G/L	Non classé	
PASTACAFFARO	AV N° 8700506	Teneur : Oxychlorure de cuivre 357.5 g/l	Non classé	R50/53
PEARL Protech	AV N° 20 20064	Teneur : Deltaméthrine 15 g/L	Non classé	R50/53
RHODIASAN	AV N° 9600120	Teneur : Thirame 80%	classé Xn N	R20/22 R43 R48/22 R50/53
SHEIK	AV N° 2000216	Teneur : Oxyfluorène 274g/l+Propyzamide 214g/l	classé Xn	R40
SUPREME	AV N° 2040348	Teneur : Acétamipride 20.2%	classé Xn	R51/53
SURROUND WP	AV N° 2060034	Teneur : Kaolin 95 %	Non classé	SC
SURFLAN	AV N° 8800142	Teneur : Oryzalin 480 g/L	classé Xi	
SWITCH	AV N° 9500568	Teneur : Cyprodinil 37,5 % + Fludioxonil 25 %	classé Xi	R43 R50/53 R43
SYLLIT	AV N° 98003928	Teneur : Dodine 400Gg/l	classé Xi	R38 R41 R43
THIOVIT JET	AV N° 2000018	Teneur : Soufre micronisé 80%	Non classé	
TOPSIN WG	AV N° 2090094	Teneur : Thiophanate-méthyl 70.4%	classé Xn N	R68 R20/22 R43 R51/53
YUCCA	AV N° 2000210	Teneur : Cuivre de l'oxychlorure de cuivre 357.5 G/L	Non classé	